

1 | Matrices

I – Généralités

Définition 1.1 – Soient n et p deux entiers non nuls. On appelle **matrice** à n lignes et p colonnes et à coefficients dans \mathbb{R} tout tableau de nombres de la forme

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,j} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,j} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,j} & \cdots & a_{i,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,j} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix},$$

avec $a_{i,j} \in \mathbb{R}$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$. Ce sont les **coefficients** de la matrice A .

L'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes se note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

Exemple 1.2 – Voici des exemples de matrices :

$$\bullet A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R}), \quad \bullet B = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R}), \quad \bullet C = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R}).$$

Remarque 1.3 – Le premier indice n (i pour les coefficients) concerne les lignes et le second indice p (j pour les coefficients) concerne les colonnes.

Proposition 1.4 – Égalité matricielle

Deux matrices sont **égales** si et seulement si elles ont le même nombre de lignes et de colonnes et les mêmes coefficients.

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{m,q}(\mathbb{R})$, avec $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} b_{1,1} & \cdots & b_{1,q} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m,1} & \cdots & b_{m,q} \end{pmatrix}$. Alors

$$A = B \iff \begin{cases} n = m, \\ p = q, \\ \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, a_{i,j} = b_{i,j}. \end{cases}$$

Exemple 1.5 – On donne

$$E = \begin{pmatrix} 2x+3 & 5 \\ 3 & -2y-4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad F = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Déterminer x et y pour que les deux matrices E et F soient égales.

Les deux matrices ont le même nombre de lignes et de colonnes. Il me reste à vérifier que tous les coefficients sont égaux. Deux parmi eux sont évidents : $5 = 5$ et $3 = 3$. Enfin,

$$E = F \iff \begin{pmatrix} 2x+3 & 5 \\ 3 & -2y-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} 2x+3 = -1 \\ -2y-4 = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{-1-3}{2} = -2 \\ y = \frac{5+4}{-2} = -\frac{9}{2} \end{cases}$$

Donc les matrices E et F sont égales si et seulement si $x = -2$ et $y = -\frac{9}{2}$.

Définition 1.6 –

- Une matrice qui possède le même nombre de lignes et de colonnes est une **matrice carrée**. L'ensemble des matrices carrées à n lignes et n colonnes se note $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ au lieu de $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$.
- Une matrice qui ne possède qu'une seule ligne est une **matrice ligne**.
- Une matrice qui ne possède qu'une seule colonne est une **matrice colonne**. Dans certaines applications, on utilise le terme "vecteur" pour parler d'une matrice colonne.

Exemple 1.7 –

- La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ \frac{1}{2} & -1 & 2 \end{pmatrix}$ est une matrice carrée de taille 3.
- La matrice $B = (1 \ 2 \ 3 \ -5)$ est une matrice ligne.
- La matrice $C = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$ est une matrice colonne.

Définition 1.8 –

- On appelle **matrice nulle** à n lignes et p colonnes et on note $0_{n,p}$ la matrice à n lignes et p colonnes dont tous les coefficients sont nuls. Si $n = p$, on écrit simplement 0_n au lieu de $0_{n,n}$.
- On appelle **matrice identité** de taille n et on note I_n la matrice **carrée** dont les coefficients de la diagonale sont égaux à 1 et tous les autres sont égaux à 0. Autrement dit,

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exemple 1.9 – Exprimer les matrices suivantes.

- $0_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,
- $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,
- $0_{5,3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,
- $I_{3,2}$ n'existe pas.

II – Opérations sur les matrices

1 – Multiplication d'une matrice par un réel

Définition 1.10 – Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et tout réel λ , on définit

$$\lambda A = \lambda \times \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{1,1} & \cdots & \lambda a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{n,1} & \cdots & \lambda a_{n,p} \end{pmatrix}.$$

Autrement dit, pour multiplier une matrice par un réel λ , on multiplie tous ses coefficients par λ .

Exemple 1.11 – Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$. Calculer $4A$.

$$4A = 4 \times \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \times 1 & 4 \times (-1) \\ 4 \times \frac{1}{2} & 4 \times \left(-\frac{1}{4}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Définition 1.12 – Pour toute matrice A , la matrice $(-1) \times A$ est notée $-A$ et s'appelle la **matrice opposée** de la matrice A .

Remarque 1.13 – L'opposée $-A$ d'une matrice A s'obtient donc en remplaçant chaque coefficient de A par son opposé.

Exemple 1.14 – Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix}$. Calculer $-A$.

$$-A = \begin{pmatrix} -(-1) & -(-2) \\ -\left(-\frac{1}{2}\right) & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \frac{1}{2} & -2 \end{pmatrix}$$

2 – Somme de deux matrices

Définition 1.15 – Soient deux matrices $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ **de même taille**. On définit

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{1,1} & \cdots & b_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n,1} & \cdots & b_{n,p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} + b_{1,1} & \cdots & a_{1,p} + b_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} + b_{n,1} & \cdots & a_{n,p} + b_{n,p} \end{pmatrix}.$$

Autrement dit, la somme des matrices A et B est la matrice **de même taille** que A et B dont chaque coefficient est la somme des coefficients correspondants de A et B .



ATTENTION ! L'addition de deux matrices n'est possible **que si elles ont le même nombre de lignes et de colonnes**.

Exemple 1.16 – Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ \frac{1}{3} & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$. Calculer $A + B$.

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ \frac{1}{3} & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2 & -1+\frac{1}{2} \\ \frac{1}{3}-1 & 2+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{2}{3} & 6 \end{pmatrix}$$

Remarque 1.17 – On définit de même la soustraction de deux matrices A et B en utilisant l'opposé :

$$A - B = A + (-B).$$

Proposition 1.18

Soient A, B et C des matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et λ et μ des réels. Alors

- par commutativité de l'addition, $A + B = B + A$,
- par associativité de l'addition, $(A + B) + C = A + (B + C)$,
- par associativité de la multiplication par un réel, $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$,
- par distributivité de la multiplication par un réel, $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ et $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$.

Exemple 1.19 – Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$.

Soit X une matrice carrée de taille 2 telle que $2X + 3A = B$. Déterminer la matrice X .

Je pose $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et je cherche à trouver a, b, c et d .

$$2X + 3A = B \iff \begin{pmatrix} 2a & 2b \\ 2c & 2d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} 2a+3 & 2b-3 \\ 2c-3 & 2d+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Or deux matrices de même taille sont égales lorsque tous leurs coefficients sont égaux.

J'obtiens donc quatre nouvelles équations réelles :

$$\begin{cases} 2a+3 = 1 \\ 2b-3 = -3 \\ 2c-3 = 1 \\ 2d+3 = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} 2a = -2 \\ 2b = 0 \\ 2c = 4 \\ 2d = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} a = -1 \\ b = 0 \\ c = 2 \\ d = 1 \end{cases}$$

Et donc $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ est la solution de l'équation matricielle $2X + 3A = B$.

Exemple 1.20 – Soient x, y et z des réels. Calculer la matrice $x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$.

Déterminer alors l'ensemble des triplets (x, y, z) vérifiant

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Je commence par calculer la matrice :

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 2x \\ 3x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4y \\ 5y \\ 6y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 7z \\ 8z \\ 9z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+4y+7z \\ 2x+5y+8z \\ 3x+6y+9z \end{pmatrix}.$$

Alors pour résoudre l'équation matricielle, je résous simultanément les trois équations réelles :

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} x+4y+7z \\ 2x+5y+8z \\ 3x+6y+9z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x + 4y + 7z = 0 \\ 2x + 5y + 8z = 0 \\ 3x + 6y + 9z = 0 \end{cases}$$

Il s'agit d'un système linéaire que je résous en utilisant des opérations élémentaires.

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + 4y + 7z = 0 \\ 2x + 5y + 8z = 0 \\ 3x + 6y + 9z = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x + 4y + 7z = 0 \\ -3y - 6z = 0 \\ 3x + 6y + 9z = 0 \end{cases} & L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ &\iff \begin{cases} x + 4y + 7z = 0 \\ -3y - 6z = 0 \\ -6y - 12z = 0 \end{cases} & L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \\ &\iff \begin{cases} x + 4y + 7z = 0 \\ -3y - 6z = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} & L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 \end{aligned}$$

Comme la troisième ligne s'annule par opérations élémentaires avec les deux premières, je conclus qu'il y a une infinité de solutions.

Je fixe alors $z \in \mathbb{R}$. La deuxième équation me donne $y = \frac{6}{-3}z = -2z$.

Puis la première équation devient $x - 8z + 7z = 0 \iff x - z = 0 \iff x = z$. Ainsi

$$\mathcal{S} = \left\{ (z, -2z, z) \mid z \in \mathbb{R} \right\}.$$

Par exemple pour $z = 1$, j'obtiens la solution $(1, -2, 1)$.

3 – Multiplication de deux matrices

Définition 1.21 – Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ une matrice quelconque et $B \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ une matrice colonne. On appelle **produit** de la matrice A par la matrice B , la matrice de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ notée $A \times B$ ou AB , définie par

$$A \times B = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1}b_1 + a_{1,2}b_2 + \cdots + a_{1,p}b_p \\ a_{2,1}b_1 + a_{2,2}b_2 + \cdots + a_{2,p}b_p \\ \vdots \\ a_{n,1}b_1 + a_{n,2}b_2 + \cdots + a_{n,p}b_p \end{pmatrix}.$$

Autrement dit, la matrice AB est une matrice colonne de taille n dont le i -ième coefficient ($i \in \llbracket 1, n \rrbracket$) est donné par

$$\sum_{k=1}^p a_{i,k} b_k.$$

Exemple 1.22 – Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$. Calculer AX .

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0-2 \\ 2-3-8 \\ -1-2-8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -9 \\ -11 \end{pmatrix}$$

Définition 1.23 – Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ deux matrices.


On appelle **produit** de la matrice A par la matrice B , la matrice de $\mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{R})$ notée $A \times B$ ou AB , définie par

$$AB = \begin{pmatrix} c_{1,1} & \cdots & c_{1,q} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{n,1} & \cdots & c_{n,q} \end{pmatrix} \quad \text{où } c_{i,j} = a_{i,1}b_{1,j} + a_{i,2}b_{2,j} + \cdots + a_{i,p}b_{p,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k}b_{k,j}.$$



ATTENTION ! Pour pouvoir effectuer le produit AB , le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B . Sinon le produit n'est pas défini.

Illustration du produit matriciel :



Exemple 1.24 – Calculer les produits matriciels suivants après avoir donné l'ensemble de matrices auquel ils appartiennent.

- $A = (1 \ 3 \ 5) \times \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_1(\mathbb{R})$ et $A = (2 + 12 + 30) = (44)$
- $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$ et $B = \begin{pmatrix} 2+12+30 \\ 2-8+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 44 \\ -6 \end{pmatrix}$
- $C = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $C = \begin{pmatrix} -4+0 & -2+18 \\ 10+0 & 5+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 16 \\ 10 & 11 \end{pmatrix}$
- $D = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $D = \begin{pmatrix} -4+5 & 6+1 \\ 0+30 & 0+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 30 & 6 \end{pmatrix}$
- $E = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \times (1 \ 3 \ 5) \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et $E = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 10 \\ 4 & 12 & 20 \\ 6 & 18 & 30 \end{pmatrix}$
- $F = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $F = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$
- $G = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $G = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
- $H = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 7 \\ 4 & 1 & -6 \\ 9 & 0 & 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ et $H = \begin{pmatrix} 2x-3y+7z \\ 4x+y-6z \\ 9x+5z \end{pmatrix}$



ATTENTION !

- La multiplication matricielle **n'est pas commutative**. En général, le produit AB (s'il existe) n'est pas égal au produit BA (s'il existe aussi).
- Un produit de deux matrices peut être égal à la matrice nulle sans qu'aucune de ces deux matrices ne soit égale à la matrice nulle.

Proposition 1.25

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$, $D \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ et $E \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{R})$. Alors

- par associativité de la multiplication de matrices, $(A \times C) \times E = A \times (C \times E)$,
- par distributivité de la multiplication de matrices, $(A + B)C = AC + BC$ et $A(C + D) = AC + AD$.

Et pour toute matrice carrée $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et toute matrice colonne $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$,

$$M \times I_n = I_n \times M = M \quad \text{et} \quad I_n \times X = X.$$

La matrice identité est l'**élément neutre** de la multiplication matricielle (comme le 1 l'est pour les réels).

Remarque 1.26 – On peut retenir que les règles de calcul sont les mêmes qu'avec les réels à l'exception que la commutativité n'est en général pas vraie pour les matrices.

4 – Lien avec les systèmes d'équations linéaires

Proposition 1.27

On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}), \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}) \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}).$$

Alors l'équation matricielle $AX = B$ est équivalente à un système d'équations linéaires :

$$AX = B \iff \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}$$

Autrement dit, le p -uplet (x_1, x_2, \dots, x_p) est solution du système à n équations et p inconnues si et seulement si la matrice colonne X est solution de l'équation matricielle $AX = B$.

Remarque 1.28 – Les matrices permettent donc une écriture beaucoup plus succincte d'un système d'équations linéaires. Par ailleurs, il sera donné dans un autre chapitre des outils matriciels permettant la résolution de tels systèmes.

Définition 1.29 – Étant donné le système linéaire à n équations et p inconnues suivant

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases},$$

la matrice des coefficients $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$ s'appelle la **matrice associée** au système.

Exemple 1.30 – Réécrire chacun des systèmes suivants sous forme d'une équation matricielle.

$$\bullet \begin{cases} 2x + y = 1 \\ x - y = -4 \end{cases}$$

Le système se réécrit sous la forme $AX = B$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

$$\bullet \begin{cases} 3x + y + z + 2t = 1 \\ y - 2z + t = 3 \\ 4z - t = 2 \\ 2t = -4 \end{cases}$$

Le système se réécrit sous la forme $AX = B$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

III – Puissance d’une matrice carrée

1 – Définition et premiers exemples

Définition 1.31 – Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice **carrée**. On pose $A^0 = I_n$ et pour tout k dans \mathbb{N}^* ,

$$A^k = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{k \text{ fois}}$$



ATTENTION! Le calcul de A^n **ne** consiste **pas** à élever les coefficients de A à la puissance n .

Remarque 1.32 – Comme pour les réels où $\forall a \in \mathbb{R}, a^0 = 1$, toute matrice élevée à la puissance 0 vaut l’élément neutre, à savoir I_n pour les matrices.

Exemple 1.33 – Soit A la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Calculer A^3 .

Je calcule tout d’abord $A^2 = A \times A$ puis multiplie à nouveau le résultat par A :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+6 & 2+8 \\ 3+12 & 6+16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A^3 = A^2 \times A = \begin{pmatrix} 7+30 & 14+40 \\ 15+66 & 30+88 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 37 & 54 \\ 81 & 118 \end{pmatrix}.$$

Proposition 1.34

Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et tous entiers naturels r et s ,

$$A^r \times A^s = A^{r+s} \quad \text{et} \quad (A^r)^s = A^{rs}.$$



ATTENTION! Puisque la multiplication matricielle **n’est pas commutative**, les autres règles usuelles sur les puissances dans \mathbb{R} ne sont pas vraies dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Par exemple, en général $(AB)^2 \neq A^2B^2$.

Exemple 1.35 – On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Calculer $(AB)^2$ et A^2B^2 puis conclure. Les matrices AB et BA sont-elles égales?

Je commence par calculer les deux matrices demandées, en faisant le produit puis le carré pour l’une et les carrés puis le produit pour l’autre :

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad (AB)^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Puis} \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{donc} \quad A^2B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

De ça, je déduis que $(AB)^2 \neq A^2B^2$. Enfin, si je suppose **par l’absurde** que $AB = BA$, alors

$$(AB)^2 = (AB) \times (AB) = ABAB = A \times (BA) \times B = A \times (AB) \times B = AAB B = (AA) \times (BB) = A^2B^2.$$

C’est absurde puisque je viens de montrer que cette égalité est fautive.

Ainsi je conclus que mon hypothèse de départ est erronée, donc que $AB \neq BA$.

Exemple 1.36 – Calculer la puissance n -ième de chacune des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Je commence par calculer A^2 et A^3 puis conjecture une formule pour A^n :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A^3 = A^2 \times A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Il me semble donc que l'expression de A^n est donnée pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par

$$A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-1)^n \end{pmatrix}.$$

Ce résultat est facilement démontrable par récurrence et c'est l'objet du prochain paragraphe.

J'adopte la même démarche pour calculer B^n :

$$B^2 = B \times B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_2.$$

Dès lors, $B^3 = B^2 \times B = 0_2 \times B = 0_2$ et de la même manière pour tout $n \geq 2$,

$$B^n = B^2 \times B^{n-2} = 0_2 \times B^{n-2} = 0_2.$$

2 – Cas d'une matrice diagonale

Proposition 1.37

Soit $D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & d_n \end{pmatrix}$ une matrice diagonale de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$D^k = \begin{pmatrix} d_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2^k & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & d_n^k \end{pmatrix}.$$

Démonstration. On démontre ce résultat par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$, dans le cas d'une matrice de taille $n = 3$.

Énoncé : On note \mathcal{P}_k la propriété : $D^k = \begin{pmatrix} d_1^k & 0 & 0 \\ 0 & d_2^k & 0 \\ 0 & 0 & d_3^k \end{pmatrix}$.

Initialisation : Pour $k = 0$, $D^0 = I_3$ et $\begin{pmatrix} d_1^0 & 0 & 0 \\ 0 & d_2^0 & 0 \\ 0 & 0 & d_3^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$. Ainsi \mathcal{P}_0 est vraie.

Hérédité : Soit $k \geq 0$. On suppose que \mathcal{P}_k est vraie et on montre que \mathcal{P}_{k+1} l'est aussi.

Par hypothèse de récurrence, on sait que $D^k = \begin{pmatrix} d_1^k & 0 & 0 \\ 0 & d_2^k & 0 \\ 0 & 0 & d_3^k \end{pmatrix}$.

Alors

$$D^{k+1} = D^k \times D = \begin{pmatrix} d_1^k & 0 & 0 \\ 0 & d_2^k & 0 \\ 0 & 0 & d_3^k \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1^{k+1} & 0 & 0 \\ 0 & d_2^{k+1} & 0 \\ 0 & 0 & d_3^{k+1} \end{pmatrix}.$$

Finalement \mathcal{P}_{k+1} est vraie et la propriété est héréditaire.

Conclusion : Comme la propriété est vraie pour $k = 0$ et est héréditaire, alors par principe de récurrence, \mathcal{P}_k est vraie pour tout $k \geq 0$, i.e.

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad D^k = \begin{pmatrix} d_1^k & 0 & 0 \\ 0 & d_2^k & 0 \\ 0 & 0 & d_3^k \end{pmatrix}.$$

□

Exemple 1.38 – Calculer pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ la puissance n -ième de la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

Comme la matrice A est diagonale, il suffit d'élever à la puissance n chaque coefficient diagonal.

Ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad A^n = \begin{pmatrix} 3^n & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^n & 0 \\ 0 & 0 & 4^n \end{pmatrix}.$$

Proposition 1.39

Soit une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. S'il existe trois matrices $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

et $D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & d_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonale telles que $A = PDQ$ et $PQ = QP = I_n$,

alors pour tout entier $k \in \mathbb{N}$,

$$A^k = PD^kQ = P \times \begin{pmatrix} d_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2^k & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & d_n^k \end{pmatrix} \times Q.$$

Exemple 1.40 – On considère les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -8 & 0 & -8 \\ 9 & 0 & 8 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer PQ et QP .

J'effectue les produits matriciels :

$$PQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1-1 & 1 & 1-1 \\ -1+1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

$$QP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1-1 & 1 & -1+1 \\ 1-1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

2. On définit la matrice $D = QAP$. Calculer D .

J'effectue les produits matriciels :

$$QA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -8 & 0 & -8 \\ 9 & 0 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1-8+9 & 0 & -8+8 \\ -1+9 & 0 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 8 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

$$D = QA \times P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 8 & 0 & 8 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 8-8 & 0 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

3. En utilisant que $D = QAP$, en déduire que $A = PDQ$.

Je sais que $D = QAP$. Ainsi en multipliant à gauche par P et à droite par Q ,

$$P \times D \times Q = P \times QAP \times Q = \underbrace{PQ}_{=I_3} \times A \times \underbrace{PQ}_{=I_3} = I_3 \times A \times I_3 = A.$$

J'ai bien montré que $A = PDQ$.

4. Calculer D^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Comme la matrice D est diagonale, alors pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$D^n = \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 & 0 \\ 0 & 0^n & 0 \\ 0 & 0 & 8^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8^n \end{pmatrix}.$$

5. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^n = PD^nQ$.

Énoncé : Je note \mathcal{P}_n la propriété : $A^n = PD^nQ$.

Initialisation : Pour $n = 0$, $A^0 = I_3$ et $PD^0Q = PI_3Q = PQ = I_3$.

Ainsi \mathcal{P}_0 est vraie.

Hérédité : Soit $n \geq 0$. Je suppose que \mathcal{P}_n est vraie et je montre que \mathcal{P}_{n+1} l'est aussi.

$$A^{n+1} = A^n \times A$$

avec $A = PDQ$, et par hypothèse de récurrence je sais que $A^n = PD^nQ$.

Donc

$$A^{n+1} = A^n \times A = PD^nQ \times PDQ = PD^n(QP)DQ = PD^n I_3 DQ = PD^n DQ = PD^{n+1}Q.$$

Finalement \mathcal{P}_{n+1} est vraie et la propriété est héréditaire.

Conclusion : Comme la propriété est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire, alors par principe de récurrence, \mathcal{P}_n est vraie pour tout $n \geq 0$, i.e.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad A^n = PD^nQ.$$

6. Calculer A^n pour tout entier $n \in \mathbb{N}$.

Je sais désormais que $A^n = PD^nQ$ et je connais l'expression des trois matrices P , D^n et Q .

J'effectue alors les produits matriciels :

$$PD^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -8^n \\ -(-1)^n & 0 & 8^n \end{pmatrix}$$

$$A^n = PD^n \times Q = \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -8^n \\ -(-1)^n & 0 & 8^n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 & 0 \\ -8^n & 0 & -8^n \\ 8^n - (-1)^n & 0 & 8^n \end{pmatrix}.$$

3– Formule du binôme de Newton

Définition 1.41 – Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On dit que A et B **commutent** si $AB = BA$.

Proposition 1.42 – Formule du binôme de Newton

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que A et B **commutent** (i.e. $AB = BA$).

Alors pour tout $p \in \mathbb{N}^*$,

$$(A + B)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^k B^{p-k} = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^{p-k} B^k.$$

Remarque 1.43 – La formule du binôme de Newton sert à calculer les puissances d’une matrice **à condition** que l’on puisse écrire celle-ci comme la somme de deux matrices qui commutent et dont on sait expliciter les puissances. Le cas le plus fréquent est celui pour lequel la matrice considérée est la somme d’une matrice diagonale et d’une matrice dont les puissances sont nulles à partir d’un certain rang, **et qui commutent**.

Exemple 1.44 – On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Justifier que $A = D + J$.

Je calcule $D + J$: $D + J = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A$. J’ai bien montré que $A = D + J$.

2. Calculer J^2 . En déduire J^n pour tout $n \geq 2$.

Je calcule J^2 : $J^2 = J \times J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_2$.

Dès lors pour tout $n \geq 2$, $J^n = J^2 \times J^{n-2} = 0_2 \times J^{n-2} = 0_2$.

3. Calculer D^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Comme la matrice D est diagonale, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $D^n = \begin{pmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & 1^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

4. À l’aide de la formule du binôme de Newton, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$A^n = D^n + \binom{n}{1} D^{n-1} J.$$

Tout d’abord, comme les matrices D et J commutent ($D = I_2$), je peux appliquer la formule du binôme de Newton à la matrice $A = D + J$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$A^n = (D + J)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D^{n-k} J^k.$$

Puis dans cette somme, le terme d’indice k est nul dès lors que $k \geq 2$, d’après la question 2..

Enfin puisque $\binom{n}{0} = 1$ et $J^0 = I_2$, alors

$$A^n = \binom{n}{0} D^n J^0 + \binom{n}{1} D^{n-1} J^1 + \underbrace{\sum_{k=2}^n \binom{n}{k} D^{n-k} J^k}_{=0_2 \text{ car } J^k=0_2 \text{ pour } k \geq 2} = D^n + \binom{n}{1} D^{n-1} J.$$

5. En déduire l’expression de A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\binom{n}{1} = n$ donc

$$A^n = D^n + \binom{n}{1} D^{n-1} J = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + n \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & n \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$