

## DEVOIR SURVEILLÉ 4

### Exercice 1 – [ESCP 2018 / Ex1]

1. a) Une matrice  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  appartenant à  $\mathcal{E}$  vérifie en particulier que  $ad - bc = 0$ .  
Or une matrice carrée de taille 2 est inversible si et seulement si  $ad - bc$  est non nul.  
Donc les matrices de  $\mathcal{E}$  ne sont pas inversibles.

- b) Il me suffit de vérifier les deux équations pour les deux matrices en question.

Pour la matrice  $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $a = b = 1$  et  $c = d = -1$ . Alors

$$a + d = 1 - 1 = 0 \quad \text{et} \quad ad - bc = 1 \times (-1) - 1 \times (-1) = -1 + 1 = 0.$$

J'ai bien montré que  $M_1 \in \mathcal{E}$ .

Pour la matrice  $M_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $a = c = 1$  et  $b = d = -1$ . Alors

$$a + d = 1 - 1 = 0 \quad \text{et} \quad ad - bc = 1 \times (-1) - (-1) \times 1 = -1 + 1 = 0.$$

J'ai bien montré que  $M_2 \in \mathcal{E}$  aussi.

- c) Je me sers des deux matrices  $M_1$  et  $M_2$  introduites à la question précédente. Je pose  
 $S = M_1 + M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ . J'obtiens que  $a = 2$ ,  $d = -2$  et  $b = c = 0$ .  
Alors

$$ad - bc = 2 \times (-2) - 0 \times 0 = -4 - 0 = -4 \neq 0.$$

Ainsi la somme de deux matrices de  $\mathcal{E}$  n'appartient pas nécessairement à  $\mathcal{E}$ .

De même, en posant  $P = M_1 \times M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$ . J'obtiens que  
 $a = d = 2$  et  $b = c = -2$ . Alors

$$a + d = 2 + 2 = 4 \neq 0.$$

Ainsi le produit de deux matrices de  $\mathcal{E}$  n'appartient pas nécessairement à  $\mathcal{E}$  non plus.

- d) Je commence par calculer le carré de la matrice  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ :  $M^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix}$ .  
Comme la matrice  $M$  est une matrice de  $\mathcal{E}$ , alors en particulier  $a + d = 0 \iff a = -d$   
et  $a^2 = d^2 = -ad$ . Ainsi je peux réécrire

$$M^2 = \begin{pmatrix} bc - ad & b(a + d) \\ c(a + d) & bc - ad \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

puisque  $bc - ad = -(ad - bc) = 0$ .

Finalement, j'ai montré que si  $M \in \mathcal{E}$ , alors  $M^2$  est la matrice nulle.

Donc pour tout entier  $n \geq 2$ ,  $M^n = M^2 \times M^{n-2} = 0_2 \times M^{n-2} = 0_2$ .

2. a) Je calcule le déterminant de la matrice  $A$ :  $\det(A) = 1 \times 5 - 2 \times (-2) = 5 + 4 = 9 \neq 0$ .  
Donc la matrice  $A$  est bien inversible.

b) Je calcule la matrice  $K$  :

$$K = A - 3I = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

J'obtiens que  $a = c = -2$  et  $b = d = 2$ . Alors

$$a + d = -2 + 2 = 0 \quad \text{et} \quad ad - bc = (-2) \times 2 - 2 \times (-2) = -4 + 4 = 0.$$

J'ai donc bien montré que  $K = A - 3I \in \mathcal{E}$ .

c) (i) Comme  $K = A - 3I$ , alors  $A = K + 3I$ . Pour calculer  $A^n$ , j'utilise la formule du binôme de Newton. Pour cela, je vérifie que les deux matrices  $K$  et  $3I$  commutent :  $K \times (3I) = 3K$  et  $(3I) \times K = 3K$  donc les matrices  $K$  et  $3I$  commutent et d'après la formule du binôme de Newton,

$$A^n = (K + 3I)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} K^k (3I)^{n-k}.$$

D'après la question **2.b**), je sais que  $K \in \mathcal{E}$  donc que  $K^k = 0_2$  pour tout  $k \geq 2$  d'après la question **1.d**). Par conséquent, tous les termes de la somme sont nuls sauf les deux premiers où  $k = 0$  et  $k = 1$ . Ainsi pour tout entier  $n \geq 2$ ,

$$A^n = \binom{n}{0} K^0 (3I)^{n-0} + \binom{n}{1} K^1 (3I)^{n-1} = 1 \times I \times 3^n I + n \times K \times 3^{n-1} I = 3^n I + n 3^{n-1} K.$$

Je remarque facilement que cette formule reste vraie pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ , puisque

$$3^0 I + 0 \times \frac{1}{3} \times K = I = A^0 \quad \text{et} \quad 3^1 I + 1 \times 1 \times K = 3I + K = A = A^1.$$

(ii) D'après la question précédente, pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$A^n = 3^n I + n 3^{n-1} K = 3^n \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + n 3^{n-1} \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^n - 2n \times 3^{n-1} & 2n \times 3^{n-1} \\ -2n \times 3^{n-1} & 3^n + 2n \times 3^{n-1} \end{pmatrix}.$$

3. a) Je me ressers ici du fait que comme  $K$  est une matrice de  $\mathcal{E}$ ,  $K^2 = 0_2$ . Ainsi  $(A - 3I)^2 = 0_2$  et comme les matrices  $A$  et  $3I$  commutent, il me suffit de développer pour obtenir un polynôme de la matrice  $A$  de degré 2 :  $(A - 3I)^2 = A^2 - 2 \times A \times 3I + (3I)^2 = A^2 - 6A + 9I = 0_2$ . Donc  $\alpha = -6$  et  $\beta = 9$  conviennent.

Pour justifier l'unicité de ce couple, je suppose par l'absurde qu'il en existe deux distincts,  $(\alpha_1, \beta_1)$  et  $(\alpha_2, \beta_2)$ , tels que  $A^2 + \alpha_1 A + \beta_1 I = A^2 + \alpha_2 A + \beta_2 I = 0_2$ .

Par soustraction, j'obtiens que  $(\alpha_1 - \alpha_2)A = (\beta_2 - \beta_1)I$ .

- Si  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$  étaient différents, j'obtiendrais en divisant par la différence que la matrice  $A$  est un multiple de la matrice  $I$ . Ce n'est pas le cas donc  $\alpha_1 = \alpha_2$ .
- Dans ce cas, si  $\beta_1$  et  $\beta_2$  étaient différents, j'obtiendrais en divisant par la différence que la matrice  $I$  est un multiple de la matrice  $0_2$ . Ce n'est pas le cas donc  $\beta_1 = \beta_2$ .

En conclusion,  $(\alpha, \beta) = (-6, 9)$  est l'unique couple de réels tels que  $A^2 + \alpha A + \beta I = 0_2$ .

b) En factorisant l'expression précédente, j'obtiens que

$$A^2 - 6A + 9I = 0 \quad \iff \quad A^2 - 6A = -9I \quad \iff \quad A \times \left( \frac{1}{-9} \times (A - 6I) \right) = I.$$

Donc la matrice  $A$  est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{9} \times (6I - A) = \frac{2}{3} I - \frac{1}{9} A.$$

c) Je remplace  $A$  par  $K + 3I$  dans l'expression précédente et j'obtiens que

$$A^{-1} = \frac{2}{3}I - \frac{1}{9}(K + 3I) = \frac{2}{3}I - \frac{1}{9}K - \frac{1}{3}I = \frac{1}{3}I - \frac{1}{9}K.$$

En remplaçant  $n$  par  $-1$  dans la formule obtenue à la question **2.c)(i)**, vérifiée pour tout  $n \geq 0$ , j'obtiens que

$$A^{-1} = 3^{-1}I + (-1) \times 3^{-1-1} \times K = \frac{1}{3}I - \frac{1}{9}K.$$

Donc la formule  $A^n = 3^n I + n3^{n-1}K$  reste valide pour  $n = -1$ .

Je raisonne par récurrence pour montrer qu'elle est vraie pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ .

Je commence par réécrire la formule adaptée à une puissance négative que je note  $-n$ ,

pour garder un entier  $n$  qui soit positif :  $A^{-n} = 3^{-n}I + (-n)3^{-n-1}K = \frac{1}{3^n}I - \frac{n}{3^{n+1}}K.$

**Énoncé :** Je note  $\mathcal{P}_n$  la propriété :  $A^{-n} = \frac{1}{3^n}I - \frac{n}{3^{n+1}}K.$

**Initialisation :** J'ai déjà vérifié que  $\mathcal{P}_1$  était vraie car  $A^{-1} = \frac{1}{3}I - \frac{1}{9}K.$

**Hérédité :** Soit  $n \geq 1$ . Je suppose que  $\mathcal{P}_n$  est vraie et je montre que  $\mathcal{P}_{n+1}$  l'est aussi.

Par hypothèse de récurrence, je sais que  $A^{-n} = \frac{1}{3^n}I - \frac{n}{3^{n+1}}K.$  Alors

$$\begin{aligned} A^{-(n+1)} &= A^{-n} \times A^{-1} = \left( \frac{1}{3^n}I - \frac{n}{3^{n+1}}K \right) \times \left( \frac{1}{3}I - \frac{1}{9}K \right) \\ &= \frac{1}{3^{n+1}}I - \left( \frac{1}{3^n \times 9} + \frac{n}{3^{n+1} \times 3} \right) K + \frac{n}{3^{n+1} \times 9} 0_2. \end{aligned}$$

Donc  $A^{-(n+1)} = \frac{1}{3^{n+1}}I - \frac{n+1}{3^{n+2}}K.$

Finalement  $\mathcal{P}_{n+1}$  est vraie et la propriété est héréditaire.

**Conclusion :** Comme la propriété est vraie pour  $n = 1$  et est héréditaire, alors par principe de récurrence,  $\mathcal{P}_n$  est vraie pour tout  $n \geq 1$ , *i.e.*

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad A^{-n} = \frac{1}{3^n}I - \frac{n}{3^{n+1}}K.$$

En particulier, ceci conclut bien la démonstration du fait que la formule obtenue à la question **2.c)(i)** reste vraie pour tout  $n \in \mathbb{Z}$  :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad A^n = 3^n I + n3^{n-1}K.$$

4. a) Je remarque  $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$ , donc l'unique racine de ce polynôme est 3.

b) Je pose  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et résous l'équation  $AX = 3X$  :

$$\begin{aligned} AX = 3X &\iff \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x \\ 3y \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} x + 2y = 3x \\ -2x + 5y = 3y \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} -2x + 2y = 0 \\ -2x + 2y = 0 \end{cases} \\ &\iff x = y \end{aligned}$$

Ainsi la matrice colonne  $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  est une solution non nulle de l'équation  $AX = 3X$ .

**Exercice 2 – [ESCP 2018 / Ex2]**

1. a) Il s'agit de calculer l'intégrale d'une fonction dont je connais une primitive.

En effet, une primitive de  $g_0(t) = t$  est donnée par  $G_0(t) = \frac{t^2}{2}$ . Ainsi

$$I_0 = \int_1^e t \, dt = \left[ \frac{t^2}{2} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{1^2}{2} = \frac{e^2 - 1}{2}.$$

- b) Je note, pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ ,  $g_n(t) = t(\ln t)^n$ . Comme  $t \in [1, e]$ , en particulier et puisque la fonction  $\ln$  est croissante sur  $\mathbb{R}_+^*$ ,

$$t \geq 1 > 0 \quad \text{et} \quad 1 \leq t \leq e \iff \ln(1) \leq \ln t \leq \ln(e), \quad \text{i.e. } \ln t \in [0, 1].$$

Donc pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$  et tout réel  $t \in [1, e]$ ,  $g_n(t) = t(\ln t)^n \geq 0$ .

Donc  $I_n$  est l'intégrale d'une fonction positive sur l'intervalle  $[1, e]$ .

J'en déduis alors que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $I_n \geq 0$ .

- c) Pour étudier le sens de variation de la suite  $I_n$ , j'étudie le signe de la différence de deux termes consécutifs. Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

$$I_{n+1} - I_n = \int_1^e t(\ln t)^{n+1} \, dt - \int_1^e t(\ln t)^n \, dt = \int_1^e t(\ln t)^n (\ln t - 1) \, dt.$$

J'ai montré à la question précédente que pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$  et tout réel  $t \in [1, e]$ ,  $t(\ln t)^n \geq 0$  et  $\ln t \in [0, 1]$ . Donc  $\ln t - 1 \leq 0$  sur  $[1, e]$ . En particulier, la fonction à intégrer est négative donc l'intégrale est négative, i.e.  $I_{n+1} - I_n \leq 0 \iff I_{n+1} \leq I_n$ . Et j'ai bien montré que la suite  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante.

Comme elle est aussi minorée par 0 d'après la question précédente, elle est décroissante minorée donc convergente par le théorème de la limite monotone.

2. a) Soit un entier  $n \in \mathbb{N}$ . Je dérive  $f_n(t) = (\ln t)^{n+1}$ .  $f_n$  est de la forme  $u^{n+1}$  avec  $u(t) = \ln t$ . Comme  $u'(t) = \frac{1}{t}$ , alors

$$\forall t \in [1, e], \quad f_n'(t) = (n+1) \times \frac{1}{t} \times (\ln t)^n = \frac{n+1}{t} (\ln t)^n.$$

- b) Je calcule l'intégrale  $I_{n+1} = \int_1^e t(\ln t)^{n+1} \, dt$  en utilisant une intégration par parties.

Je pose

$$u'(t) = t \quad \text{et} \quad v(t) = (\ln t)^{n+1}.$$

Alors

$$u(t) = \frac{t^2}{2} \quad \text{et} \quad v'(t) = \frac{n+1}{t} (\ln t)^n.$$

Alors par intégration par parties,

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \left[ \frac{t^2}{2} (\ln t)^{n+1} \right]_1^e - \int_1^e \frac{t^2}{2} \times \frac{n+1}{t} (\ln t)^n \, dt \\ &= \frac{e^2}{2} \times 1^{n+1} - \frac{1^2}{2} \times 0^{n+1} - \frac{n+1}{2} \int_1^e t(\ln t)^n \, dt = \frac{e^2}{2} - \frac{n+1}{2} I_n. \end{aligned}$$

En multipliant par 2 cette expression, j'obtiens bien que pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$2I_{n+1} = e^2 - (n+1)I_n \iff 2I_{n+1} + (n+1)I_n = e^2.$$

- c) J'utilise la formule précédente avec  $n = 0$  et la valeur de  $I_0$  calculée à la question **1.a)** pour déterminer la valeur de  $I_1$  :

$$2I_1 + 1 \times I_0 = e^2 \iff 2I_1 = e^2 - I_0 = e^2 - \frac{e^2 - 1}{2} = \frac{e^2 + 1}{2} \iff I_1 = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

- d) Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Grâce aux indications de l'énoncé, comme  $I_{n+1} \leq I_n$ , alors

$$e^2 = 2I_{n+1} + (n+1)I_n \leq 2I_n + (n+1)I_n = (n+3)I_n \iff I_n \geq \frac{e^2}{n+3}.$$

Et de la même manière, en appliquant la formule cette fois en  $n-1$ , puisque  $I_{n-1} \geq I_n$ ,

$$e^2 = 2I_n + nI_{n-1} \geq 2I_n + nI_n = (n+2)I_n \iff I_n \leq \frac{e^2}{n+2}.$$

Ainsi j'ai bien montré que pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\frac{e^2}{n+3} \leq I_n \leq \frac{e^2}{n+2}$ .

- e) Puisque  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^2}{n+3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^2}{n+2} = 0$  et que pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\frac{e^2}{n+3} \leq I_n \leq \frac{e^2}{n+2}$ , alors par le théorème des gendarmes,

la limite de la suite  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  (qui existe par la question **1.c)**) est donnée par

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0.$$

Concernant la limite de la suite  $(nI_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , j'obtiens un encadrement en multipliant l'encadrement précédent par  $n$  : pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\frac{n}{n+3}e^2 \leq nI_n \leq \frac{n}{n+2}e^2$ .

Mais alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+2} = 1$  comme limites de fractions rationnelles.

Donc par produit  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+3}e^2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+2}e^2 = e^2$  et par le théorème des gendarmes, j'en déduis que la suite  $(nI_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge et que sa limite est donnée par

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} nI_n = e^2.$$

- f) Je n'ai qu'à compléter la valeur initiale de  $I_0$  et la formule de récurrence de  $I_{n+1}$ .

Dans la boucle for, je calcule la valeur de  $I_{k+1}$  donc  $n+1$  est à remplacer par  $k+1$ .

```

1. import numpy as np
2. def calculI(n):
3.     I=(np.e**2-1)/2
4.     for k in range(n):
5.         I=np.e**2/2-I*(k+1)/2
6.     return I
    
```

3. a) Je repars de l'encadrement obtenu à la question **2.d)**, appliqué aux termes  $I_n$  et  $I_{n+1}$ . Soit un entier  $n \in \mathbb{N}$ .

$$\frac{e^2}{n+3} \leq I_n \leq \frac{e^2}{n+2} \quad \text{et donc} \quad \frac{e^2}{n+4} \leq I_{n+1} \leq \frac{e^2}{n+3}.$$

Alors en faisant la somme de  $2I_{n+1}$  et de  $I_n$ ,

$$\begin{aligned} 2 \times \frac{e^2}{n+4} + \frac{e^2}{n+3} &\leq 2I_{n+1} + I_n \leq 2 \times \frac{e^2}{n+3} + \frac{e^2}{n+2} \\ \iff \frac{(2(n+3) + (n+4))e^2}{(n+3)(n+4)} &\leq 2I_{n+1} + I_n \leq \frac{(2(n+2) + (n+3))e^2}{(n+2)(n+3)} \\ \iff \frac{(3n+10)e^2}{(n+3)(n+4)} &\leq 2I_{n+1} + I_n \leq \frac{(3n+7)e^2}{(n+2)(n+3)}. \end{aligned}$$

- b) Je raisonne de nouveau par encadrement, grâce au résultat de la question précédente. Pour cela, je remarque que d'après la formule de la question **2.b**,

$$2I_{n+1} + (n+1)I_n = e^2 \iff 2I_{n+1} + I_n = e^2 - nI_n.$$

Alors en multipliant par  $n$  l'encadrement de la question précédente, j'obtiens que

$$\frac{n(3n+10)e^2}{(n+3)(n+4)} \leq n(2I_{n+1} + I_n) = n(e^2 - nI_n) \leq \frac{n(3n+7)e^2}{(n+2)(n+3)}.$$

Mais alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(3n+10)}{(n+3)(n+4)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(3n+7)}{(n+2)(n+3)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2}{n^2} = 3$  comme limites de fractions rationnelles. Donc par produit

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(3n+10)e^2}{(n+3)(n+4)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(3n+7)e^2}{(n+2)(n+3)} = 3e^2$$

et par le théorème des gendarmes, j'en déduis que la suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge et que sa limite est donnée par

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 3e^2.$$

4. Je raisonne par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$ .

**Énoncé :** Je note  $\mathcal{P}_n$  la propriété :  $I_n = \frac{(-1)^n n!}{2^{n+1}} \left( e^2 \sum_{k=0}^n \frac{(-2)^k}{k!} - 1 \right)$ .

**Initialisation :** Pour  $n = 0$ ,

$$I_0 = \frac{e^2 - 1}{2} \quad \text{et} \quad \frac{(-1)^0 \times 0!}{2^{0+1}} \left( e^2 \sum_{k=0}^0 \frac{(-2)^k}{k!} - 1 \right) = \frac{1}{2} \times (e^2 \times 1 - 1) = \frac{e^2 - 1}{2}.$$

Ainsi  $\mathcal{P}_0$  est vraie.

**Hérédité :** Soit  $n \geq 0$ . Je suppose que  $\mathcal{P}_n$  est vraie et je montre que  $\mathcal{P}_{n+1}$  l'est aussi.

Par hypothèse de récurrence, je sais que  $I_n = \frac{(-1)^n n!}{2^{n+1}} \left( e^2 \sum_{k=0}^n \frac{(-2)^k}{k!} - 1 \right)$ .

Alors en réutilisant l'expression de  $I_{n+1}$  obtenue dans la question **2.b**,

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \frac{e^2}{2} - \frac{n+1}{2} I_n = \frac{e^2}{2} - \frac{n+1}{2} \times \frac{(-1)^n n!}{2^{n+1}} \left( e^2 \sum_{k=0}^n \frac{(-2)^k}{k!} - 1 \right) \\ &= \frac{e^2}{2} + \frac{(-1)^{n+1} (n+1)!}{2^{n+2}} \left( e^2 \sum_{k=0}^n \frac{(-2)^k}{k!} - 1 \right) \\ &= \frac{(-1)^{n+1} (n+1)!}{2^{n+2}} \left( \frac{2^{n+2}}{(-1)^{n+1} (n+1)!} \times \frac{e^2}{2} + e^2 \sum_{k=0}^n \frac{(-2)^k}{k!} - 1 \right) \\ &= \frac{(-1)^{n+1} (n+1)!}{2^{n+2}} \left( e^2 \frac{(-2)^{n+1}}{(n+1)!} + e^2 \sum_{k=0}^n \frac{(-2)^k}{k!} - 1 \right) \\ &= \frac{(-1)^{n+1} (n+1)!}{2^{n+2}} \left( e^2 \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(-2)^k}{k!} - 1 \right) \end{aligned}$$

Finalement  $\mathcal{P}_{n+1}$  est vraie et la propriété est héréditaire.

**Conclusion :** Comme la propriété est vraie pour  $n = 0$  et est héréditaire, alors par principe de récurrence,  $\mathcal{P}_n$  est vraie pour tout  $n \geq 0$ , i.e.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad I_n = \frac{(-1)^n n!}{2^{n+1}} \left( e^2 \sum_{k=0}^n \frac{(-2)^k}{k!} - 1 \right).$$

**Exercice 3 – [ESCP 2018 / Ex3]**

1. a) Au départ, l'urne contient une boule rouge et une boule blanche. Si je tire la boule rouge, je la remets et en ajoute une seconde. Il y a donc deux boules rouges et une boule blanche à ce moment là dans l'urne. Si je tire la boule blanche, je la remets et en ajoute une seconde. Il y a donc deux boules blanches et une boule rouge à ce moment là dans l'urne. J'ai bien montré que le nombre de boules rouges à l'issue de la première expérience est 1 ou 2, *i.e.*

$$X_1(\Omega) = \{1, 2\} = \llbracket 1, 2 \rrbracket.$$

Au premier tirage, il y a une chance sur deux de tirer la boule rouge et une chance sur deux de tirer la boule blanche. Ainsi

$$P(X_1 = 1) = P(B_1) = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad P(X_1 = 2) = P(R_1) = \frac{1}{2}.$$

Il s'agit d'une situation d'équiprobabilité :  $X_1$  suit la loi uniforme sur  $\llbracket 1, 2 \rrbracket$ . Alors

$$E(X_1) = \frac{n+1}{2} = \frac{2+1}{2} = \frac{3}{2} \quad \text{et} \quad V(X_1) = \frac{n^2-1}{12} = \frac{2^2-1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}.$$

- b) À l'issue du deuxième tirage, il y a :

- une seule boule rouge si deux boules blanches ont été tirées,
- deux boules rouges si une boule rouge et une boule blanche ont été tirées,
- trois boules rouges si deux boules rouges ont été tirées.

Ainsi, en termes d'événements, comme il y a deux possibilités pour le tirage bicolore,

$$[X_2 = 1] = B_1 \cap B_2,$$

$$[X_2 = 2] = (B_1 \cap R_2) \cup (R_1 \cap B_2),$$

$$[X_2 = 3] = R_1 \cap R_2.$$

- c) À l'aide de la question précédente, je détermine la loi de  $X_2$ .  
Tout d'abord, le support est donné par  $X_2(\Omega) = \llbracket 1, 3 \rrbracket$ .

- D'après la formule des probabilités composées,

$$P(X_2 = 1) = P(B_1 \cap B_2) = P(B_1) \times P_{B_1}(B_2) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

- Par indépendance des événements et la formule des probabilités composées,

$$P(X_2 = 2) = P(B_1) \times P_{B_1}(R_2) + P(R_1) \times P_{R_1}(B_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.$$

- D'après la formule des probabilités composées,

$$P(X_2 = 3) = P(R_1 \cap R_2) = P(R_1) \times P_{R_1}(R_2) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

En résumé, la loi de la variable aléatoire  $X_2$  est donnée par

$k$	1	2	3
$P(X_2 = k)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

Ainsi  $X_2$  suit bien une loi uniforme sur  $\llbracket 1, 3 \rrbracket$ . Alors

$$E(X_2) = \frac{n+1}{2} = \frac{3+1}{2} = 2 \quad \text{et} \quad V(X_2) = \frac{n^2-1}{12} = \frac{3^2-1}{12} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}.$$

2. a) Je détermine la loi conjointe du couple  $(X_1, X_2)$  en étudiant chaque événement :

- L'événement  $[X_1 = 1, X_2 = 1]$  décrit un nombre de boules rouges qui n'a pas évolué ni à l'issue du premier tirage ni à l'issue du deuxième tirage. Cela signifie donc qu'une boule blanche a été piochée au premier et au deuxième tirages.

$$\text{Ainsi } P(X_1 = 1, X_2 = 1) = P(B_1 \cap B_2) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

- L'événement  $[X_1 = 1, X_2 = 2]$  décrit une boule blanche tirée en premier (puisque le nombre de boules rouges n'a pas évolué à l'issue du premier tirage), puis une boule rouge tirée en second (puisque le nombre de boules rouges a augmenté à l'issue du deuxième tirage). Ainsi  $P(X_1 = 1, X_2 = 2) = P(B_1 \cap R_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ .

- L'événement  $[X_1 = 1, X_2 = 3]$  est impossible puisque pour passer de 1 à 3 boules rouges, il faudrait en ajouter deux en un seul tirage. Ainsi  $P(X_1 = 1, X_2 = 3) = 0$ .

- L'événement  $[X_1 = 2, X_2 = 1]$  est impossible puisque le nombre de boules rouges ne peut pas diminuer d'un tirage à l'autre. Ainsi  $P(X_1 = 2, X_2 = 1) = 0$ .

- L'événement  $[X_1 = 2, X_2 = 2]$  décrit une boule rouge tirée en premier (puisque le nombre de boules rouges a augmenté à l'issue du premier tirage), puis une boule blanche tirée en second (puisque le nombre de boules rouges n'a pas évolué à l'issue du deuxième tirage). Ainsi  $P(X_1 = 2, X_2 = 2) = P(R_1 \cap B_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ .

- Enfin, l'événement  $[X_1 = 2, X_2 = 3]$  décrit un nombre de boules rouges qui augmente à l'issue du premier tirage et à l'issue du deuxième tirage. Cela signifie donc qu'une boule rouge a été piochée au premier et au deuxième tirages.

$$\text{Ainsi } P(X_1 = 2, X_2 = 3) = P(R_1 \cap R_2) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

Je déduis de cette analyse le tableau de la loi conjointe du couple suivant :

	$X_2 = 1$	$X_2 = 2$	$X_2 = 3$
$X_1 = 1$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	0
$X_1 = 2$	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$

b) Je commence par calculer  $E(X_1 X_2)$  à l'aide de la loi conjointe :

$$E(X_1 X_2) = 1 \times 1 \times \frac{1}{3} + 1 \times 2 \times \frac{1}{6} + 1 \times 3 \times 0 + 2 \times 1 \times 0 + 2 \times 2 \times \frac{1}{6} + 2 \times 3 \times \frac{1}{3} = \frac{1+1+2+6}{3} = \frac{10}{3}.$$

Puis d'après la formule de König-Huygens, en utilisant les espérances déjà calculées,

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = E(X_1 X_2) - E(X_1)E(X_2) = \frac{10}{3} - \frac{3}{2} \times 2 = \frac{10}{3} - 3 = \frac{10-9}{3} = \frac{1}{3}.$$

Si les variables aléatoires  $X_1$  et  $X_2$  étaient indépendantes, alors la covariance  $\text{Cov}(X_1, X_2)$  serait nulle. Or ce n'est pas le cas. Donc  $X_1$  et  $X_2$  ne sont pas indépendantes.

3. a) L'événement  $[X_n = 1]$  décrit une situation où le nombre de boules rouges n'a pas évolué au cours des  $n$  premiers tirages.

Ainsi  $[X_n = 1]$  signifie que seules des boules blanches ont été tirées, *i.e.*

$$[X_n = 1] = B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_n.$$



b) D'après la formule des probabilités composées,

$$\begin{aligned} P(X_n = 1) &= P(B_1) \times P_{B_1}(B_2) \times P_{B_1 \cap B_2}(B_3) \times \cdots \times P_{B_1 \cap \cdots \cap B_{n-1}}(B_n) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \cdots \times \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1} \quad \text{après simplifications.} \end{aligned}$$

À l'inverse, pour que l'urne contienne  $n+1$  boules rouges à l'issue du  $n$ -ième tirage, il faut avoir tiré  $n$  boules rouges lors des  $n$  premiers tirages. Ainsi

$$[X_n = n+1] = R_1 \cap R_2 \cap \cdots \cap R_n.$$

Puis d'après la formule des probabilités composées,

$$\begin{aligned} P(X_n = n+1) &= P(R_1) \times P_{R_1}(R_2) \times P_{R_1 \cap R_2}(R_3) \times \cdots \times P_{R_1 \cap R_2 \cap \cdots \cap R_{n-1}}(R_n) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \cdots \times \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1} \quad \text{après simplifications.} \end{aligned}$$

4. a) Tout d'abord, à l'issue du  $n$ -ième tirage, l'urne contient au total  $n+2$  boules car elle en contient 2 initialement et que l'on en rajoute une à chaque tirage.

Si l'événement  $[X_n = k-1]$  est réalisé, c'est-à-dire si l'urne contient  $k-1$  boules rouges à l'issue du  $n$ -ième tirage, alors l'événement  $[X_{n+1} = k]$  est réalisé si l'urne contient  $k$  boules rouges à l'issue du  $(n+1)$ -ième tirage.

Cela revient à dire qu'une boule rouge a été ajoutée, donc qu'une boule rouge a été tirée. Or il y a  $k-1$  boules rouges parmi les  $n+2$  boules de l'urne. Donc

$$P_{[X_n = k-1]}(X_{n+1} = k) = \frac{k-1}{n+2}.$$

De même, si l'événement  $[X_n = k]$  est réalisé, c'est-à-dire si l'urne contient  $k$  boules rouges à l'issue du  $n$ -ième tirage, alors l'événement  $[X_{n+1} = k]$  est réalisé si l'urne contient  $k$  boules rouges à l'issue du  $(n+1)$ -ième tirage.

Cela revient à dire qu'une boule blanche a été tirée. Or il y a  $n+2-k$  boules blanches parmi les  $n+2$  boules de l'urne. Donc

$$P_{[X_n = k]}(X_{n+1} = k) = \frac{n+2-k}{n+2}.$$

b) S'il y a  $k$  boules rouges dans l'urne à l'issue du  $(n+1)$ -ième tirage, alors il ne pouvait y en avoir que  $k$  ou  $k-1$  à l'issue du  $n$ -ième tirage.

Ainsi d'après la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned} P(X_{n+1} = k) &= P(X_n = k) \times P_{[X_n = k]}(X_{n+1} = k) + P(X_n = k-1) \times P_{[X_n = k-1]}(X_{n+1} = k) \\ \Leftrightarrow P(X_{n+1} = k) &= \frac{n+2-k}{n+2} \times P(X_n = k) + \frac{k-1}{n+2} \times P(X_n = k-1). \end{aligned}$$

J'obtiens bien ainsi une relation entre  $P(X_{n+1} = k)$ ,  $P(X_n = k)$  et  $P(X_n = k-1)$ .

c) Je raisonne par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}^*$ .

**Énoncé :** Je note  $\mathcal{P}_n$  la propriété : " $X_n$  suit la loi uniforme sur  $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$ ".

**Initialisation :** Pour  $n=1$ , j'ai déjà montré à la question 1.a) que  $X_1$  suit la loi uniforme sur  $\llbracket 1, 2 \rrbracket$ . Ainsi  $\mathcal{P}_1$  est vraie.

**Hérédité :** Soit  $n \geq 1$ . Je suppose que  $\mathcal{P}_n$  est vraie et je montre que  $\mathcal{P}_{n+1}$  l'est aussi.

Par hypothèse de récurrence, je sais que  $X_n$  suit la loi uniforme sur  $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$ , i.e.

$$\forall k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket, \quad P(X_n = k) = \frac{1}{n+1}.$$

- Si  $k = 1$ , alors je sais déjà grâce à la question **3.b)** que  $P(X_{n+1} = 1) = \frac{1}{n+2}$ .
- De même si  $k = n+2$ , alors je sais que  $P(X_{n+1} = n+2) = \frac{1}{n+2}$ .
- Et pour tous les  $k \in \llbracket 2, n+1 \rrbracket$ , j'utilise la relation exhibée à la question **4.b)** :

$$\begin{aligned} P(X_{n+1} = k) &= \frac{n+2-k}{n+2} \times P(X_n = k) + \frac{k-1}{n+2} \times P(X_n = k-1) \\ &= \frac{n+2-k}{n+2} \times \frac{1}{n+1} + \frac{k-1}{n+2} \times \frac{1}{n+1} \quad \text{par hypothèse de récurrence} \\ &= \frac{1}{n+1} \left( \frac{n+2-k}{n+2} + \frac{k-1}{n+2} \right) = \frac{1}{n+1} \times \frac{n+1}{n+2} = \frac{1}{n+2}. \end{aligned}$$

Donc pour tout  $k \in \llbracket 1, n+2 \rrbracket$ ,  $P(X_{n+1} = k) = \frac{1}{n+2}$ , i.e.  $X_{n+1}$  suit la loi uniforme sur  $\llbracket 1, n+2 \rrbracket$ . Finalement  $\mathcal{P}_{n+1}$  est vraie et la propriété est héréditaire.

**Conclusion :** Comme la propriété est vraie pour  $n = 1$  et est héréditaire, alors par principe de récurrence,  $\mathcal{P}_n$  est vraie pour tout  $n \geq 1$ , i.e.

pour tout entier  $n \geq 1$ ,  $X_n$  suit la loi uniforme sur  $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$ .

5. Pour compléter le programme, il suffit d'incrémenter la valeur représentant le nombre de boules rouges ou blanches, selon la valeur de l'entier aléatoire. Et finalement, x contient le nombre de boules rouges. D'où

```

1. import numpy.random as rd
2. def simulationX(n):
3.     r=1; b=1
4.     for k in range(n):
5.         if rd.random()<r/(r+b):
6.             r=r+1
7.         else:
8.             b=b+1
9.     x=r
10.    return x

```

6. a) La seule différence entre les variables aléatoires  $X_n$  et  $Y_n$  réside en la couleur des boules considérées. Les expériences sont les mêmes et l'état initial de l'urne, une boule rouge et une boule blanche, termine de démontrer la symétrie parfaite entre ces deux variables aléatoires. Elles suivent donc toutes les deux la même loi.
- b)  $X_n$  compte le nombre de boules rouges dans l'urne quand  $Y_n$  compte le nombre de boules blanches de l'urne. Ainsi la somme  $X_n + Y_n$  correspond au nombre total de boules dans l'urne à l'issue du  $n$ -ième tirage, à savoir  $n+2$ . Donc

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad X_n + Y_n = n+2.$$

- c) Je sais que  $X_n + Y_n = n+2$ , donc  $Y_n = n+2 - X_n$  et

$$\text{Cov}(X_n, Y_n) = \text{Cov}(X_n, n+2 - X_n) = \text{Cov}(X_n, n+2) - \text{Cov}(X_n, X_n) = 0 - V(X_n) = -V(X_n).$$

Par ailleurs, comme les variables  $X_n$  et  $Y_n$  suivent la même loi, alors  $V(X_n) = V(Y_n)$ . Donc le coefficient de corrélation linéaire est donné par

$$\rho(X_n, Y_n) = \frac{\text{Cov}(X_n, Y_n)}{\sqrt{V(X_n)}\sqrt{V(Y_n)}} = \frac{-V(X_n)}{V(X_n)} = -1.$$

**Exercice 4 – [ECRICOME 2012 / Ex1]**

1. a) La matrice  $A$  est une matrice triangulaire dont tous les coefficients diagonaux sont égaux à 1, donc non nuls. Ainsi la matrice  $A$  est inversible.

Pour calculer l'inverse de  $A$ , j'applique la méthode du pivot de Gauss :

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Finalement, l'inverse de la matrice  $A$  est donnée par  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

- b) Je raisonne par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$ .

**Énoncé :** Je note  $\mathcal{P}_n$  la propriété :

$$\text{"il existe deux réels } u_n \text{ et } v_n \text{ tels que } A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2u_n & 1 & 0 \\ v_n & u_n & 1 \end{pmatrix}\text{"}$$

**Initialisation :** Pour  $n = 0$ ,  $A^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  donc en posant  $u_0 = v_0 = 0$ ,

$\mathcal{P}_0$  est bien vraie.

**Hérédité :** Soit  $n \geq 0$ . Je suppose que  $\mathcal{P}_n$  est vraie et je montre que  $\mathcal{P}_{n+1}$  l'est aussi.

Par hypothèse de récurrence, il existe  $u_n$  et  $v_n$  tels que  $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2u_n & 1 & 0 \\ v_n & u_n & 1 \end{pmatrix}$ .

Alors

$$A^{n+1} = A^n \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2u_n & 1 & 0 \\ v_n & u_n & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2u_n - 2 & 1 & 0 \\ v_n - 2u_n & u_n - 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Alors en posant  $u_{n+1} = u_n - 1$  et  $v_{n+1} = v_n - 2u_n$ , j'obtiens bien que

$$A^{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2u_{n+1} & 1 & 0 \\ v_{n+1} & u_{n+1} & 1 \end{pmatrix}.$$

Finalement  $\mathcal{P}_{n+1}$  est vraie et la propriété est héréditaire.

**Conclusion :** Comme la propriété est vraie pour  $n = 0$  et est héréditaire, alors par principe de récurrence,  $\mathcal{P}_n$  est vraie pour tout  $n \geq 0$ , *i.e.*

pour tout entier  $n \geq 0$ , il existe deux réels  $u_n$  et  $v_n$  tels que  $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2u_n & 1 & 0 \\ v_n & u_n & 1 \end{pmatrix}$ .

En particulier, les suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont définies par

$$u_0 = v_0 = 0 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} u_{n+1} = u_n - 1, \\ v_{n+1} = v_n - 2u_n. \end{cases}$$

- c) Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , j'ai trouvé que  $u_{n+1} = u_n - 1$ . Donc la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est arithmétique, de raison  $r = -1$ . Je peux donc trouver une formule explicite pour la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = u_0 + n \times r = 0 + n \times (-1) = -n.$$

- d) Je raisonne par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}^*$ .

**Énoncé :** Je note  $\mathcal{P}_n$  la propriété :  $v_n = 2 \sum_{k=0}^{n-1} k$ .

**Initialisation :** Pour  $n = 1$ ,

$$v_1 = v_0 - 2u_0 = 0 - 2 \times 0 = 0 \quad \text{et} \quad 2 \sum_{k=0}^{1-1} k = 2 \times 0 = 0.$$

Ainsi  $\mathcal{P}_1$  est vraie.

**Hérédité :** Soit  $n \geq 1$ . Je suppose que  $\mathcal{P}_n$  est vraie et je montre que  $\mathcal{P}_{n+1}$  l'est aussi.

Par hypothèse de récurrence,  $v_n = 2 \sum_{k=0}^{n-1} k$ .

Alors

$$v_{n+1} = v_n - 2u_n = 2 \sum_{k=0}^{n-1} k - 2 \times (-n) = 2 \times \left( \sum_{k=0}^{n-1} k + n \right) = 2 \times \sum_{k=0}^n k.$$

Donc  $v_{n+1} = 2 \sum_{k=0}^{n+1-1} k$ . Finalement  $\mathcal{P}_{n+1}$  est vraie et la propriété est héréditaire.

**Conclusion :** Comme la propriété est vraie pour  $n = 1$  et est héréditaire, alors par principe de récurrence,  $\mathcal{P}_n$  est vraie pour tout  $n \geq 1$ , *i.e.*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = 2 \sum_{k=0}^{n-1} k.$$

- e) Je sais que  $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ . Donc pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $v_n = 2 \times \frac{(n-1) \times n}{2} = n(n-1)$ .

Et finalement

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2u_n & 1 & 0 \\ v_n & u_n & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2n & 1 & 0 \\ n(n-1) & -n & 1 \end{pmatrix}.$$

2. a) La fonction  $f$  est de la forme  $u \times v$  avec  $u(x) = ax^2 + bx + c$  et  $v(x) = e^{-x}$ . Comme  $u'(x) = 2ax + b$  et  $v'(x) = -e^{-x}$ , alors

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x) \times v(x) + u(x) \times v'(x) = (2ax + b)e^{-x} + (ax^2 + bx + c)(-e^{-x}) \\ &= (-ax^2 + (2a - b)x + (b - c))e^{-x} = (a_1x^2 + b_1x + c_1)e^{-x}, \end{aligned}$$

en posant  $a_1 = -a$ ,  $b_1 = 2a - b$  et  $c_1 = b - c$ .

Pour vérifier l'égalité matricielle  $\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = -A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ , je calcule le produit  $-A \times \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$  :

$$-A \times \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} a \\ -2a + b \\ -b + c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a \\ 2a - b \\ b - c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi j'ai bien montré que  $\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = -A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ .

b) Puisque  $\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = -A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ , alors  $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = -A^{-1} \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix}$ , *i.e.*

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = -A^{-1} \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} a_1 \\ 2a_1 + b_1 \\ 2a_1 + b_1 + c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_1 \\ -2a_1 - b_1 \\ -2a_1 - b_1 - c_1 \end{pmatrix}.$$

3. La question **2.a)** me permet d'exprimer, pour une fonction de la forme précisée, les coefficients de la dérivée en fonction de ceux de la fonction de départ. La question **2.b)** me permet elle de faire le chemin inverse, à savoir d'exprimer les coefficients de la fonction de départ en fonction de ceux de la dérivée. Donc d'exprimer les coefficients d'une primitive en fonction de ceux de la fonction de départ. J'applique donc cette méthode pour trouver une primitive de chacune des deux fonctions  $r$  et  $s$ .

- Pour  $r$ ,  $a_1 = 0$ ,  $b_1 = 1$ ,  $c_1 = 1$  donc  $a = 0$ ,  $b = -1$ ,  $c_1 = -1 - 1 = -2$ .

Ainsi une primitive de  $r$  est donnée par  $R(x) = (-x - 2)e^{-x}$ .

- Pour  $s$ ,  $a_1 = 1$ ,  $b_1 = 1$ ,  $c_1 = 0$  donc  $a = -1$ ,  $b = -2 - 1 = -3$ ,  $c_1 = -2 - 1 = -2$ .

Ainsi une primitive de  $s$  est donnée par  $S(x) = (-x^2 - 3x - 3)e^{-x}$ .

4. a) Tout d'abord, je remarque que pour tout  $x \geq 0$ ,  $g(x) = \frac{1}{2}r(x)$  et  $xg(x) = \frac{1}{2}s(x)$ .

Ainsi

$$\begin{aligned} \int_0^X g(x) dx &= \int_0^X \frac{r(x)}{2} dx = \left[ \frac{R(x)}{2} \right]_0^X = \frac{R(X) - R(0)}{2} \\ &= \frac{(-X - 2)e^{-X} - (-0 - 2)e^{-0}}{2} = \frac{2 - (X + 2)e^{-X}}{2} = 1 - \frac{X + 2}{2e^X}. \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned} \int_0^X xg(x) dx &= \int_0^X \frac{s(x)}{2} dx = \left[ \frac{S(x)}{2} \right]_0^X = \frac{S(X) - S(0)}{2} \\ &= \frac{(-X^2 - 3X - 3)e^{-X} - (-0^2 - 3 \times 0 - 3)e^{-0}}{2} \\ &= \frac{3 - (X^2 + 3X + 3)e^{-X}}{2} = \frac{3}{2} - \frac{X^2 + 3X + 3}{2e^X}. \end{aligned}$$

b) Par croissances comparées, je sais que

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X + 2}{2e^X} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X^3 + 3X + 3}{2e^X} = 0.$$

J'en déduis alors que les deux intégrales  $\int_0^{+\infty} g(x) dx$  et  $\int_0^{+\infty} xg(x) dx$  convergent et que

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} g(x) dx &= \lim_{X \rightarrow +\infty} \int_0^X g(x) dx = 1 - 0 = 1, \\ \int_0^{+\infty} xg(x) dx &= \lim_{X \rightarrow +\infty} \int_0^X xg(x) dx = \frac{3}{2} - 0 = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

c) Je vérifie les trois conditions de la définition d'une densité :

- Pour  $x < 0$ ,  $g(x) = 0 \geq 0$  et pour  $x \geq 0$ ,  $g(x) = \frac{1}{2}(x+1)e^{-x} \geq 0$  car  $x+1 \geq 1 > 0$ .  
Donc  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $g(x) \geq 0$ .
- La fonction  $g$  est continue sur  $] -\infty, 0[$  car constante et elle est continue sur  $[0, +\infty[$  comme produit de fonctions continues.  
Donc  $g$  admet au plus un point de discontinuité en 0.

- Il reste à montrer que l'intégrale  $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx$  converge et vaut 1.

J'étudie séparément les intégrales  $\int_{-\infty}^0 g(x) dx$  et  $\int_0^{+\infty} g(x) dx$  :

▷ Tout d'abord,  $\int_{-\infty}^0 g(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx$  converge et vaut 0.

▷ Et par la question précédente, l'intégrale  $\int_0^{+\infty} g(x) dx$  converge et vaut 1.

Je conclus avec la relation de Chasles : l'intégrale  $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx$  converge et vaut

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx = \int_{-\infty}^0 g(x) dx + \int_0^{+\infty} g(x) dx = 0 + 1 = 1.$$

La fonction  $g$  vérifie les trois conditions donc  $g$  est bien une densité de probabilité.

d) La variable aléatoire  $Y$  admet une espérance si et seulement si l'intégrale  $\int_{-\infty}^{+\infty} xg(x) dx$  converge. J'étudie séparément les intégrales  $\int_{-\infty}^0 xg(x) dx$  et  $\int_0^{+\infty} xg(x) dx$ .

- Tout d'abord,  $\int_{-\infty}^0 xg(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx$  converge et vaut 0.

- Et par une question précédente, l'intégrale  $\int_0^{+\infty} xg(x) dx$  converge et vaut  $\frac{3}{2}$ .

Je conclus avec la relation de Chasles :

l'intégrale  $\int_{-\infty}^{+\infty} xg(x) dx$  converge donc la variable aléatoire  $Y$  admet une espérance et

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} xg(x) dx = \int_{-\infty}^0 xg(x) dx + \int_0^{+\infty} xg(x) dx = 0 + \frac{3}{2} = \frac{3}{2}.$$