

BSB 2017

Exercice 1 –

1. Je calcule P^2 puis P^3 :

$$P^2 = P \times P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

et

$$P^3 = P^2 \times P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

J'obtiens finalement que $P^3 = I$, *i.e.* $P \times P^2 = I$.

J'en déduis alors que P est inversible et que $P^{-1} = P^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

2. Je calcule $P^{-1}A$ puis multiplie le résultat par P :

$$P^{-1} \times A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

et

$$P^{-1}A \times P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = L.$$

Ainsi j'ai bien montré que $P^{-1}AP = L$.

3. a) Je raisonne par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.

Énoncé : Je note \mathcal{P}_n la propriété : $P^{-1}A^nP = L^n$.

Initialisation : Pour $n = 0$,

$$P^{-1}A^0P = P^{-1}IP = P^{-1}P = I \quad \text{et} \quad L^0 = I.$$

Ainsi \mathcal{P}_0 est vraie.

Hérédité : Soit $n \geq 0$. Je suppose que \mathcal{P}_n vraie et je montre que \mathcal{P}_{n+1} l'est aussi.

Par hypothèse de récurrence, $P^{-1}A^nP = L^n$. Alors

$$L^{n+1} = L^n \times L = P^{-1}A^nP \times P^{-1}AP = P^{-1}A^nIAP = P^{-1}A^{n+1}P.$$

Donc $P^{-1}A^{n+1}P = L^{n+1}$. Finalement \mathcal{P}_{n+1} est vraie et la propriété est héréditaire.

Conclusion : Comme la propriété est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire, alors par principe de récurrence, \mathcal{P}_n est vraie pour tout $n \geq 0$, *i.e.*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad P^{-1}A^nP = L^n.$$

b) Je détermine J puis calcule ses puissances successives :

$$J = L - I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$J^2 = J \times J = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

et

$$J^3 = J^2 \times J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_3.$$

c) D'après la question précédente, pour tout $k \geq 3$, $J^k = J^3 \times J^{k-3} = 0_3 \times J^{k-3} = 0_3$.
Par ailleurs, les matrices I et J commutent donc je peux appliquer la formule du binôme de Newton à la matrice $L = I + J$. J'obtiens alors

$$L^n = (I + J)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} I^{n-k} J^k.$$

Comme tous les termes de cette somme sont nuls dès lors que $k \geq 3$, j'obtiens que

$$\forall n \geq 2, \quad L^n = \binom{n}{0} I^{n-0} J^0 + \binom{n}{1} I^{n-1} J^1 + \binom{n}{2} I^{n-2} J^2 = I + nJ + \frac{n(n-1)}{2} J^2.$$

d) D'après les résultats obtenus aux questions précédentes, pour $n \geq 2$,

$$L^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2n & 0 \\ 0 & 0 & 2n \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2n(n-1) \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2n & 2n(n-1) \\ 0 & 1 & 2n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour $n = 0$ et $n = 1$, cette formule me donne les matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \times 0 & 2 \times 0 \times (-1) \\ 0 & 1 & 2 \times 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I = L^0 \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \times 1 & 2 \times 1 \times 0 \\ 0 & 1 & 2 \times 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = L = L^1.$$

Donc cette formule est bien valable pour tous les entiers naturels $n \in \mathbb{N}$.

e) Je sais désormais que $P^{-1}A^nP = L^n$, donc que $PL^nP^{-1} = PP^{-1}A^nPP^{-1} = IA^nI = A^n$.
Ainsi $A^n = PL^nP^{-1}$ et il ne me reste plus qu'à calculer les produits :

$$P \times L^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2n & 2n(n-1) \\ 0 & 1 & 2n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2n & 2n(n-1) \\ 0 & 1 & 2n \end{pmatrix}$$

et

$$A^n = PL^n \times P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2n & 2n(n-1) \\ 0 & 1 & 2n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2n(n-1) & 1 & 2n \\ 2n & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. a) La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite constante égale à $u_1 = 1$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_n = 1.$$

b) Pour $n \geq 1$, je calcule le produit AX_n :

$$A \times X_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ v_n + 2w_n \\ 2 + w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ v_{n+1} \\ w_{n+1} \end{pmatrix} = X_{n+1}.$$

Ainsi j'ai bien montré que $X_{n+1} = AX_n$.

c) Je raisonne par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$.

Énoncé : Je note \mathcal{P}_n la propriété : $X_n = A^{n-1}X_1$.

Initialisation : Pour $n = 1$, $A^0X_1 = IX_1 = X_1$. Ainsi \mathcal{P}_1 est vraie.

Hérédité : Soit $n \geq 1$. Je suppose que \mathcal{P}_n est vraie et je montre que \mathcal{P}_{n+1} l'est aussi.

Par hypothèse de récurrence, $X_n = A^{n-1}X_1$. Alors

$$X_{n+1} = A \times X_n = A \times A^{n-1}X_1 = A^n X_1.$$

Donc $X_{n+1} = A^{n+1-1}X_1$. Finalement \mathcal{P}_{n+1} est vraie et la propriété est héréditaire.

Conclusion : Comme la propriété est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire, alors par principe de récurrence, \mathcal{P}_n est vraie pour tout $n \geq 1$, *i.e.*

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad X_n = A^{n-1}X_1.$$

d) Par définition, je sais que $X_n = \begin{pmatrix} 1 \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$. Or j'ai montré que $X_n = A^{n-1}X_1$.

Donc il me suffit de calculer $X_n = A^{n-1}X_1$ pour déduire les formules de v_n et w_n :

$$A^{n-1}X_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2(n-1)(n-2) & 1 & 2(n-1) \\ 2(n-1) & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2(n-1)(n-2) + 4(n-1) \\ 2(n-1) + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2n(n-1) \\ 2n \end{pmatrix}$$

Ainsi j'en déduis bien que pour tout $n \geq 1$,

$$v_n = 2n(n-1) \quad \text{et} \quad w_n = 2n.$$

5. a) La ligne 1 doit être complétée de la façon suivante : 1. $A = [1, 0, 0; 0, 1, 2; 2, 0, 1]$.

b) Il faut, pour chaque i , mémoriser le deuxième coefficient de la matrice colonne X .

D'où la réponse C : $v(i) = X(2)$.

c) De la même manière, pour mémoriser les termes de la suite $(w_n)_{n \geq 1}$, il faut cette fois considérer le troisième coefficient de la matrice colonne X . D'où $w(i) = X(3)$.

Finalement, voici le programme complété :

```

1. A=[1,0,0;0,1,2;2,0,1].
2. u=zeros(1,10)
3. v=zeros(1,10)
4. w=zeros(1,10)
5. u(1)=1,v(1)=0,w(1)=2
6. X=[1;0;2]
7. for i=2:10
8.     X=A*X
9.     u(i)=1
10.    v(i)=X(2)
11.    w(i)=X(3)
12. end

```

Exercice 2 –

1. a) Je calcule la limite de la fonction
- g
- en
- $+\infty$
- :

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \end{array} \right\} \text{Par produit, } \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^x = +\infty.$$

Donc par somme,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^x - 1 = +\infty.$$

- b) La fonction
- g
- est donnée sous la forme d'une somme. Plus particulièrement,
- g
- est de la forme
- $g(x) = u(x) \times v(x) - 1$
- avec
- $u(x) = x$
- et
- $v(x) = e^x$
- . Comme
- $u'(x) = 1$
- et
- $v'(x) = e^x$
- , alors

$$g'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x + 0 = (x+1)e^x.$$

Pour obtenir les variations de g , il me faut étudier le signe de $g'(x)$: pour tout $x \geq 0$, $x+1 > 0$ et $e^x > 0$ donc $g'(x) > 0$. Ainsi la fonction g est strictement croissante sur \mathbb{R}_+ . De plus, $g(0) = -1$, ce qui me permet de déduire le tableau des variations suivant pour la fonction g sur $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty[$:

x	0	α	$+\infty$
$g'(x)$			+
g	-1	0	$+\infty$

Remarque : J'anticipe la question suivante en plaçant le réel α .

- c) Sur l'intervalle $[0, +\infty[$, la fonction g est dérivable donc continue. Elle y est aussi strictement croissante d'après le tableau de variation précédent. Aussi, comme $g(0) = -1$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique antécédent de 0 dans l'intervalle $[0, +\infty[$ (l'unicité provenant de la stricte monotonie). Donc l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[0, +\infty[$. Plus précisément, puisque $g(0) = -1 < 0$ et $g(1) = e - 1 \approx 1.7 > 0$, alors j'en déduis que $0 < \alpha < 1$, *i.e.*

$$\alpha \in [0, 1].$$

- d) Je sais désormais que la fonction g est strictement croissante sur $[0, +\infty[$ et qu'elle s'annule en α . Alors le signe de $g(x)$ est directement donné par le tableau suivant :

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$		-	0 +

2. a) Je calcule les limites de la fonction
- f
- en
- 0^+
- et en
- $+\infty$
- :

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} -\ln(x) = +\infty \end{array} \right\} \text{Par somme, } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x - \ln(x) = +\infty.$$

Lorsque x tend vers $+\infty$, les formules habituelles me donnent une forme indéterminée. Je réécris donc la fonction f sous une forme plus adaptée aux croissances comparées :

$$\forall x > 0, \quad f(x) = x \left(\frac{e^x}{x} - \frac{\ln(x)}{x} \right).$$

Alors par croissances comparées,

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{\ln(x)}{x} = 0 \end{array} \right\} \text{Par somme, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} - \frac{\ln(x)}{x} = +\infty.$$

Puis

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} - \frac{\ln(x)}{x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \end{array} \right\} \text{Par produit, } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{e^x}{x} - \frac{\ln(x)}{x} \right) = +\infty.$$

b) La fonction f est donnée sous la forme d'une somme donc je dérive terme à terme :

$$f'(x) = e^x - \frac{1}{x} = \frac{xe^x}{x} - \frac{1}{x} = \frac{xe^x - 1}{x} = \frac{g(x)}{x}.$$

Ainsi j'ai bien montré que $\forall x > 0, \quad f'(x) = \frac{g(x)}{x}$.

Pour obtenir les variations de f , il me faut étudier le signe de $f'(x)$: sur $]0, +\infty[$, $x > 0$ et j'ai déjà étudié le signe de $g(x)$. J'en déduis donc le tableau de variation de f :

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

c) Par définition, α est l'unique solution de l'équation $g(\alpha) = 0$. Donc $\alpha \times e^\alpha - 1 = 0$. Par suite, $\alpha \times e^\alpha = 1$ et puisque α est non nul (je sais que $g(0) = -1$), je peux en conclure que le réel α vérifie

$$\frac{1}{\alpha} = e^\alpha.$$

Par conséquent, en utilisant cette identité dans les deux sens, j'obtiens que

$$f(\alpha) = e^\alpha - \ln(\alpha) = \frac{1}{\alpha} + \ln\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{1}{\alpha} + \ln(e^\alpha) = \frac{1}{\alpha} + \alpha.$$


Ainsi j'ai bien montré que $f(\alpha) = \alpha + \frac{1}{\alpha}$.

3. a) D'après la question **2.b)**, pour tout $x > 0$, $f'(x) = e^x - \frac{1}{x}$. Ainsi f' est donnée sous la forme d'une somme, donc je dérive terme à terme :

$$f''(x) = e^x - \left(-\frac{1}{x^2}\right) = e^x + \frac{1}{x^2}.$$

b) Pour tout $x > 0$, $e^x > 0$ et $\frac{1}{x^2} > 0$ donc $f''(x) = e^x + \frac{1}{x^2} > 0$ ce qui d emontre que la fonction f est convexe sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

4. Voici l'allure de la courbe repr esentative de la fonction f .



Exercice 3 –

1. Selon l'énoncé, à l'instant 0, l'enfant se trouve au niveau A . Alors à l'instant 1, il sera toujours au niveau A avec probabilité $\frac{1}{3}$ et il passera au niveau B avec probabilité $\frac{2}{3}$. Donc

$$a_1 = \frac{1}{3}, \quad b_1 = \frac{2}{3} \quad \text{et} \quad c_1 = 0.$$

2. À l'instant n , l'enfant se trouve au niveau A , B ou C . Donc $\{A_n, B_n, C_n\}$ forme un système complet d'événements. Alors par la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= P(A_{n+1}) = P(A_n \cap A_{n+1}) + P(B_n \cap A_{n+1}) + P(C_n \cap A_{n+1}) \\ &= P(A_n) \times P_{A_n}(A_{n+1}) + P(B_n) \times P_{B_n}(A_{n+1}) + P(C_n) \times P_{C_n}(A_{n+1}) \\ &= a_n \times \frac{1}{3} + b_n \times 0 + c_n \times 0 = \frac{1}{3} a_n \end{aligned}$$

De la même manière,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= P(B_{n+1}) = P(A_n \cap B_{n+1}) + P(B_n \cap B_{n+1}) + P(C_n \cap B_{n+1}) \\ &= P(A_n) \times P_{A_n}(B_{n+1}) + P(B_n) \times P_{B_n}(B_{n+1}) + P(C_n) \times P_{C_n}(B_{n+1}) \\ &= a_n \times \frac{2}{3} + b_n \times \frac{1}{3} + c_n \times 0 = \frac{2}{3} a_n + \frac{1}{3} b_n \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= P(C_{n+1}) = P(A_n \cap C_{n+1}) + P(B_n \cap C_{n+1}) + P(C_n \cap C_{n+1}) \\ &= P(A_n) \times P_{A_n}(C_{n+1}) + P(B_n) \times P_{B_n}(C_{n+1}) + P(C_n) \times P_{C_n}(C_{n+1}) \\ &= a_n \times 0 + b_n \times \frac{2}{3} + c_n \times 1 = \frac{2}{3} b_n + c_n \end{aligned}$$

Finalement j'ai bien montré que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$a_{n+1} = \frac{1}{3} a_n, \quad b_{n+1} = \frac{2}{3} a_n + \frac{1}{3} b_n \quad \text{et} \quad c_{n+1} = \frac{2}{3} b_n + c_n.$$

3. Je sais que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = \frac{1}{3} a_n$. Donc la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{3}$. Comme l'enfant débute au niveau A , le premier terme est $a_0 = 1$.

Je peux alors donner la forme explicite de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$: pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n = a_0 \times q^n = 1 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{3^n}.$$

J'ai bien montré que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n = \frac{1}{3^n}.$$

4. a) Pour montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique, j'exprime v_{n+1} en fonction de v_n pour un $n \in \mathbb{N}$ quelconque :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= 3^{n+1} b_{n+1} = 3^{n+1} \left(\frac{2}{3} a_n + \frac{1}{3} b_n \right) = 3^n (2a_n + b_n) \\ &= 2 \times 3^n a_n + 3^n b_n = 2 \times 3^n \times \frac{1}{3^n} + v_n = 2 + v_n \end{aligned}$$

Finalement j'ai montré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = v_n + 2$.

Donc la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien une suite arithmétique de raison $r = 2$.

- b) Comme la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique de raison $r = 2$ et de premier terme $v_0 = 3^0 b_0 = 1 \times 0 = 0$, je peux alors donner sa forme explicite : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = v_0 + n \times r = 0 + n \times 2 = 2n.$$

Et puisque pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 3^n b_n$, alors j'en déduis que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad b_n = \frac{v_n}{3^n} = \frac{2n}{3^n}.$$

5. Pour tout entier naturel n , la somme des probabilités $a_n + b_n + c_n$ correspond à la probabilité que l'enfant soit au niveau A , au niveau B ou au niveau C . Ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n + b_n + c_n = 1.$$

Je peux alors en déduire une expression de c_n en fonction de n grâce aux expressions désormais connues pour a_n et b_n :

$$c_n = 1 - a_n - b_n = 1 - \frac{1}{3^n} - \frac{2n}{3^n} = 1 - \frac{2n+1}{3^n}.$$

Comme par croissances comparées $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+1}{3^n} = 0$, alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = 1.$$

Cela signifie que l'enfant terminera par arriver au niveau C avec une probabilité 1.

6. a) Les valeurs prises par la variable aléatoire X sont entières. En outre, il faut au moins deux étapes pour arriver du niveau A au niveau C . Ainsi X peut prendre n'importe quelle valeur entière supérieure ou égale à 2.
- b) Soit $n \geq 2$. L'événement $[X = n]$ correspond au fait que l'enfant atteint le sommet à l'instant n , donc qu'il se trouve au niveau C à l'instant n mais est encore au niveau B à l'instant $n-1$. Cela justifie bien l'égalité ensembliste $[X = n] = B_{n-1} \cap C_n$.
- c) D'après la question précédente et en me servant des formules déjà connues, pour $n \geq 2$, en appliquant la formules des probabilités composées, j'obtiens que

$$P(X = n) = P(B_{n-1} \cap C_n) = P(B_{n-1}) \times P_{B_{n-1}}(C_n) = \frac{2(n-1)}{3^{n-1}} \times \frac{2}{3} = \frac{4(n-1)}{3^n}.$$

7. a) La variable aléatoire X_1 suit une loi géométrique de paramètre $p = \frac{2}{3}$.
En effet, X_1 est le rang du premier succès "monter au niveau B " lors de répétitions identiques et indépendantes d'expériences de Bernoulli (montera ou ne montera pas) de probabilité de succès $p = \frac{2}{3}$.
Le support de X_1 est donné par $X_1(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$P(X_1 = k) = p(1-p)^{k-1} = \frac{2}{3} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{k-1} = \frac{2}{3^k}.$$

L'espérance de X_1 est donnée par $E(X_1) = \frac{1}{p} = \frac{1}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2}$.

- b) Il s'agit exactement de la même situation sauf que l'enfant se trouve cette fois au niveau B et le succès devient "monter au niveau C ", avec la même probabilité $p = \frac{2}{3}$.
Donc X_2 suit aussi une loi géométrique de paramètre $p = \frac{2}{3}$.

- c) Le nombre d' etapes n ecessaires pour rejoindre le niveau C depuis le niveau A est  egal  a la somme du nombre d' etapes pour passer de A  a B et de celui pour passer de B  a C . Ainsi

$$X = X_1 + X_2.$$

Comme X_1 admet une esp erance et que X_2 suit la m eme loi que X_1 , alors X_2 admet une esp erance et $E(X_2) = E(X_1) = \frac{3}{2}$.

Puis par lin earit e, la variable al eatoire X admet aussi une esp erance et

$$E(X) = E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2) = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3.$$

Exercice 4 –

1. a) Soit $A \geq 1$. Je cherche à calculer $I(A) = \int_1^A \frac{\alpha}{t^{\alpha+1}} dt$. Je commence par chercher une primitive à $f(t) = \frac{\alpha}{t^{\alpha+1}} = \alpha \times t^{-(\alpha+1)}$. Une primitive de f est donnée par

$$F(t) = \alpha \times \frac{t^{-(\alpha+1)+1}}{-(\alpha+1)+1} = \alpha \times \frac{t^{-\alpha}}{-\alpha} = -t^{-\alpha} = -\frac{1}{t^\alpha}.$$

Finalement

$$I(A) = \int_1^A \frac{\alpha}{t^{\alpha+1}} dt = \left[-\frac{1}{t^\alpha} \right]_1^A = -\frac{1}{A^\alpha} + \frac{1}{1^\alpha} = 1 - \frac{1}{A^\alpha}.$$

- b) • Pour $t < 1$, $f(t) = 0 \geq 0$ et pour $t \geq 1$, $f(t) = \frac{\alpha}{t^{\alpha+1}} \geq 0$, car $\alpha > 1$ et $t \geq 1$.
Donc f est positive sur \mathbb{R} .
- La fonction f est continue sur $] -\infty, 1[$ car constante et elle est continue sur $[1, +\infty[$ comme fraction rationnelle. Donc f admet au plus un point de discontinuité.
- Il reste à montrer que l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt$ converge et vaut 1.

Or $\int_{-\infty}^1 f(t) dt = \int_{-\infty}^1 0 dt$ converge et vaut 0 et d'après la question précédente, $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ est la limite de $I(A)$ lorsque A tend vers $+\infty$. Comme $\lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{A^\alpha} = 0$, alors l'intégrale généralisée $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ converge et vaut $\lim_{A \rightarrow +\infty} I(A) = 1 - 0 = 1$.

Alors par la relation de Chasles, l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt$ converge et vaut

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = \int_{-\infty}^1 f(t) dt + \int_1^{+\infty} f(t) dt = 0 + 1 = 1.$$

Selon les trois points précédents, f décrit bien une densité de probabilité.

2. a) Soit $A \geq 1$. Je cherche à calculer $J(A) = \int_1^A \frac{\alpha}{t^\alpha} dt$. Je commence par chercher une primitive à $f(t) = \frac{\alpha}{t^\alpha} = \alpha \times t^{-\alpha}$. Une primitive de f est donnée par

$$F(t) = \alpha \times \frac{t^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} = \frac{\alpha}{1-\alpha} \times t^{-(\alpha-1)} = \frac{\alpha}{1-\alpha} \times \frac{1}{t^{\alpha-1}}.$$

Finalement

$$J(A) = \int_1^A \frac{\alpha}{t^\alpha} dt = \left[\frac{\alpha}{1-\alpha} \times \frac{1}{t^{\alpha-1}} \right]_1^A = \frac{\alpha}{1-\alpha} \times \left(\frac{1}{A^{\alpha-1}} - \frac{1}{1^{\alpha-1}} \right) = \frac{\alpha}{1-\alpha} \left(\frac{1}{A^{\alpha-1}} - 1 \right).$$

- b) La variable aléatoire X admet une espérance si et seulement si l'intégrale généralisée $\int_{-\infty}^{+\infty} t f(t) dt$ converge. Or $\int_{-\infty}^1 t f(t) dt = \int_{-\infty}^1 0 dt$ converge et vaut 0 et d'après la question précédente, $\int_1^{+\infty} t f(t) dt$ est la limite de $J(A)$ lorsque A tend vers $+\infty$.

Comme $\lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{A^{\alpha-1}} = 0$, alors l'intégrale généralisée $\int_1^{+\infty} t f(t) dt$ converge et vaut

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} J(A) = \frac{\alpha}{1-\alpha} \times (0 - 1) = -\frac{\alpha}{1-\alpha} = \frac{\alpha}{\alpha-1}.$$

Alors par la relation de Chasles, l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} t f(t) dt$ converge, *i.e.* la variable aléatoire X admet une espérance et

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} t f(t) dt = \int_{-\infty}^1 t f(t) dt + \int_1^{+\infty} t f(t) dt = 0 + \frac{\alpha}{\alpha-1} = \frac{\alpha}{\alpha-1}.$$

Ainsi j'ai bien montré que $E(X) = \frac{\alpha}{\alpha-1}$.

3. La fonction de répartition F de X est donnée par $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$.

Je raisonne par disjonction de cas :

- Si $x < 1$, alors $F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$.
- Si $x \geq 1$, alors $F(x) = \int_{-\infty}^1 0 dt + \int_1^x \frac{\alpha}{t^{\alpha+1}} dt = I(x) = 1 - \frac{1}{x^\alpha}$.

Ainsi j'ai montré que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1, \\ 1 - \frac{1}{x^\alpha} & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

4. a) Je cherche $P(X > 2)$, pour un paramètre α égal à 2 :

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - F(2) = 1 - \left(1 - \frac{1}{2^\alpha}\right) = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}.$$

La probabilité que la bougie reste allumée plus de deux heures est $\frac{1}{4}$.

De même, la probabilité pour que la bougie reste allumée entre deux et trois heures est

$$P(2 < X < 3) = F(3) - F(2) = \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) - \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) = 1 - \frac{1}{9} - 1 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} - \frac{1}{9} = \frac{5}{36}.$$

b) Il s'agit là d'une probabilité conditionnelle : je suppose que l'événement $[X > 2]$ est vérifié et j'étudie la probabilité que l'événement $[X > 3]$ se réalise.

D'après la formule des probabilités conditionnelles,

$$P_{[X > 2]}(X > 3) = \frac{P([X > 2] \cap [X > 3])}{P(X > 2)} = \frac{P(X > 3)}{P(X > 2)} = \frac{1 - F(3)}{\frac{1}{4}} = \left(1 - \left(1 - \frac{1}{3^2}\right)\right) \times 4 = \frac{4}{9}.$$

5. a) Par définition de la fonction de répartition, pour tout réel $x \in \mathbb{R}$,

$$G(x) = P(Y \leq x) = P(\ln(X) \leq x) = P(X \leq e^x) = F(e^x).$$

b) Grâce au résultat de la question 3.,

- Si $x \geq 1$, alors $e^x \geq 1$ et $G(x) = F(e^x) = 1 - \frac{1}{(e^x)^\alpha} = 1 - \frac{1}{e^{\alpha x}} = 1 - e^{-\alpha x}$.
- Si $x < 0$, alors $e^x < 1$ et $G(x) = F(e^x) = 0$.

Ainsi j'ai montré que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$G(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 - e^{-\alpha x} & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

- c) Je reconnais en G la fonction de répartition d'une loi exponentielle de paramètre α .
Donc Y suit une loi exponentielle de paramètre α , *i.e.* $Y \hookrightarrow \mathcal{E}(\alpha)$. En particulier,

$$E(Y) = \frac{1}{\alpha} \quad \text{et} \quad V(Y) = \frac{1}{\alpha^2}.$$

6. a) Les X_i représentent les durées de vie des bougies, donc elles suivent la même loi que X . Alors les $\ln(X_i)$ suivent la même loi que $Y = \ln(X)$. Donc pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,
 $E(\ln(X_i)) = E(Y) = \frac{1}{\alpha}$ et par linéarité de l'espérance,

$$E(Z_n) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(X_i)\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(\ln(X_i)) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{n} \times n \times \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\alpha}.$$

Comme $E(Z_n) = \frac{1}{\alpha}$, alors Z_n est bien un estimateur sans biais de $\frac{1}{\alpha}$.

- b) De la même manière qu'à la question précédente, je sais que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,
 $V(\ln(X_i)) = V(Y) = \frac{1}{\alpha^2}$. Dès lors, comme les X_i sont indépendantes,

$$V(Z_n) = V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(X_i)\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(\ln(X_i)) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\alpha^2} = \frac{1}{n^2} \times n \times \frac{1}{\alpha^2} = \frac{1}{n\alpha^2}.$$

Et comme Z_n est un estimateur sans biais, alors le risque quadratique est donné directement par la variance. Donc

$$r(Z_n) = \frac{1}{n\alpha^2}.$$

7. L'instruction `mean(log(X))` donne la moyenne des logarithmes des valeurs contenues dans la matrice X : il s'agit exactement de Z_{100} . Comme Z_n est un estimateur sans biais de $\frac{1}{\alpha}$, une estimation de α est donnée par

$$\frac{1}{Z_{100}} \approx \frac{1}{0.33} \approx 3.$$

La durée de vie moyenne d'une bougie est donnée par l'espérance de X , calculée à la question **2.b)**. En remplaçant α par mon estimation dans la formule obtenue, j'obtiens que

$$E(X) = \frac{\alpha}{\alpha-1} \approx \frac{3}{3-1} = \frac{3}{2}.$$

Ainsi la durée de vie moyenne d'une bougie est d'environ une heure et demie selon cette estimation.